

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน



โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน
แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



อาการผู้ป่วย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- บิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง ม่านตาขยาย

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

ระยะอัมพาต

- บ้าลายโหล
- คางห้อยตก
- ลับลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค
ผู้ติดเชื้อมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

อย่าแห่

คาถา
๕ย
กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



อย่าแหยก

สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
เป่ล่า



อย่าหยิบ

อาหารที่สุนัขกำลังกิน



อย่ายุ่ง

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ

